

CALCION

FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

*Aplicação Via Foliar***CÁLCIO MÓVEL DE RÁPIDA TRANSLOCAÇÃO E AÇÃO BIOESTIMULANTE**

Produto de síntese pura de compostos carbonados, complexado com nitrogênio, fósforo de origem alimentar, cálcio, magnésio e boro solubilizados por processo único e prontamente reconhecido através da estrutura celular. Enriquecido com a ação bioestimulante de algas e aminoácidos que acelera o metabolismo promovendo nutrição a nível celular de forma completa e equilibrada. Atua inibindo a formação do etileno nas plantas.

BENEFÍCIOS: efetivo para suprir e suplementar rapidamente as carências de cálcio, magnésio e boro, reduzindo o abortamento floral e aumentando a fixação dos frutos, legumes e grãos. Pode ser aplicado em plena florada. Dá resistências as estruturas celulares das plantas e dos frutos na colheita, transporte e na prateleira. Recomendado no manejo para retardar a maturação na programação de colheita.

APLICAÇÃO: pulverização foliar, doses de 1 a 2 litros por ha, em todo o ciclo até o fim do período de crescimento das plantas e frutos. No manejo para retardar a colheita, em doses sequencias cada 15 dias. E no final do enchimento dos frutos, para resistência celular dos tecidos das frutas. No manejo para retardar a colheita usar de 1 a 2 litros por ha, a cada 10 a 14 dias. Usar vazões que permitam boa e uniforme cobertura de toda a planta.

INDICAÇÃO DE USO

ALGODÃO – Pulverização foliar, 2 litros por ha, 30 dias após a abertura das flores, para fixação das maçãs. Repetir se necessário.

CAFÉ – Pulverizar foliar, 2 litros por ha, no início da formação do chumbinho para aumentar o pegamento dos grãos. Repetir se necessário

FRUTÍFERAS EM GERAL - cítricos, banana, uva e oliveiras - Pulverização foliar, usar de 3 litros por ha, pós florada para fixação dos frutos, dividindo em duas a três vezes a dose até o final do enchimento das frutas.

HORTALIÇAS - TUBÉRCULOS, BULBOS, RAÍZES –Pulverizar foliar, usar 2 litros por ha, pós florada para fixação das estruturas reprodutivas, dividindo a dose em 2 a 3 aplicações.

HORTALIÇAS COM FRUTAS - tomate, pimentão, abobrinha, pepino, morango, berries e outras – Pulverizar foliar 2 litros por ha, suprir carências e para fixação das frutas. Repetir após cada florada.

HORTALIÇAS SEM FRUTAS - Alface, Brócolis, Repolho, Espinafre, Alcachofra e outros - pulverizar foliar, usar 1 litro por ha, aos 15 dias após a emergência das plantas, repetir se necessário em 7 a 10 dias e sempre que necessário para corrigir deficiências.

VOLUME DE CALDA

Nas pulverizações usar vazões acima de 200 litros de calda que permitam boa cobertura das folhas.

Ao associar a defensivos fazer teste em pequeno volume, exemplo 2 litros de água, colocar os produtos na dose proporcional recomendada para ver a compatibilidade.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Manter em local seco, fresco, ventilado e protegido do calor. As recomendações são parte do nosso programa básico de nutrição, e podem ser otimizadas de acordo com fatores climáticos, análises de solo e foliar e recomendações técnicas.

Produto superconcentrado, agitar bem antes de usar. Pré diluir 5 vezes no volume de água. Não reutilizar a embalagem. Trabalhar sempre com equipamento limpo. Não aplicar nas horas mais quentes do dia. Aplicar as doses recomendadas.

MATÉRIAS PRIMAS

Ácido Fosfórico, Ureia, Glicose, Carbonato de Cálcio, Ácido Bórico, Sulfato de Magnésio, Extrato de algas, Aminoácido e água.

GARANTIAS

Nitrogênio solúvel em água – 2,2%, Fósforo Solúvel em água – 21%, Cálcio solúvel em água - 1% Magnésio solúvel em água – 0,4%, Boro solúvel em água – 0,5%, Carbono orgânico – 6% Densidade - 1,2.

Registro do produto no MAPA SC nº 001438-9.00005

Obs: Os produtos devem ser utilizados de acordo com as orientações técnicas, de forma responsável em qualquer fase do manuseio, transporte e estocagem.